Immagini: BGK/SSPR



Zoppina: Biosicurezza

Come prevenire l'introduzione dell'agente patogeno della zoppina nell'allevamento. Reinfezione a seguito di campioni positivi con tampone: Misure da adottare per eliminare l'agente patogeno della zoppina dall'allevamento.



Persone estranee all'azienda

• Visitatori, tosatori di pecore, veterinari: cambiare le scarpe, usare copriscarpe monouso o disinfettare le scarpe





Animali di nuovo acquisto/Scambio di arieti

Prima dell'introduzione nel gregge di nuovi capi:

- Isolamento preventivo per 4 settimane
- Bagno degli unghielli
- Prelievo di campioni con tampone, anche da singoli animali





Bagno degli unghielli dopo mostre/esposizioni o trasporti Reinfezione: il bagno egli unghielli va ripetuto almeno 3 volte a distanza di 1 settimana

- Far sostare gli animali nel bagno podale per 10 minuti
- Anche le capre vanno sottoposte al bagno podale





Al termine del bagno degli unghielli

- Condurre gli animali su un pascolo nuovo (solo dopo l'interruzione del pascolamento con animali per minimo 4 settimane)
- Oppure sistemarli nelle stalle su lettiere con rinnovo completo dello strame





Attenzione

- Pulizia dei mezzi di trasporto e della rampa di carico/scarico
- Dopo il bagno podale: evitare sentieri percorsi in precedenza o le medesime aree adibite all'uscita

© Copyright: La riproduzione o la pubblicazione dell'opuscolo e delle immagini o parti di esse sono consentite unicamente con citazione della fonte previa autorizzazione scritta della Sede amministrativa.