



# Zoppina: Biosicurezza

Come posso impedire l'introduzione dell'agente patogeno della zoppina nel mio gregge?



## Persone estranee all'azienda: visitatori, veterinari

- Disinfezione<sup>1</sup> degli stivali o delle scarpe (vasca, tappeto disinfettante)
- Tenere a disposizione / offrire stivali aziendali o copriscarpe



## Acquisto di animali / Scambio di arieti

- Quarantena prima dell'integrazione nel gregge
- Pediluvio<sup>2</sup> all'inizio della quarantena (bagno degli unghielli per almeno 10 minuti)
- In caso di dubbio, prelievo di tamponi (al più presto 10 giorni dopo l'ultimo pediluvio, a spese proprie)



## Dopo esposizioni, trasporti o dopo la tosatura delle pecore

- Pediluvio<sup>2</sup> (bagno degli unghielli, per almeno 10 minuti)

## Veicoli di trasporto

- Pulire e disinfettare<sup>1</sup> accuratamente prima e dopo l'uso

<sup>1</sup>**Disinfettanti** per bagno degli stivali o per superfici e attrezzature: Desintec® Hoofcare spezial D, Virkon® S, P3-oxisan® ZS, Halag Stalldes 05

<sup>2</sup>**Prodotto per il pediluvio:**  
Desintec® Hoofcare spezial D

## Quarantena

Idealmente per 4 settimane, ma almeno per 14 giorni, tenuti in un box spazialmente separato dal resto del gregge, che può essere pulito e disinfettato<sup>1</sup> dopo la quarantena.

Utilizzare stivali e indumenti protettivi separati e guanti monouso per lavorare nell'area di quarantena.