



# Zoppina - Reinfezione: Biosicurezza

Reinfezione/Risultato positivo a seguito di campioni con tampone: Misure da adottare per eliminare l'agente patogeno della zoppina dall'allevamento



## Persone estranee all'azienda

- Visitatori, tosatori di pecore, veterinari: cambiare le scarpe, usare copriscarpe monouso o disinfettare le scarpe



## Animali di nuovo acquisto/Scambio di arieti

Prima dell'introduzione nel gregge di nuovi capi:

- Isolamento preventivo per 4 settimane
- Bagno degli unghielli
- Prelievo di campioni con tampone, anche da singoli animali



## Il bagno agli unghielli va ripetuto almeno 3 volte a distanza di 1 settimana

- Far sostare gli animali nel bagno podale per 10 minuti
- Anche le capre vanno sottoposte al bagno podale



## Al termine del bagno degli unghielli

- Condurre gli animali su un pascolo nuovo (solo dopo l'interruzione del pascolamento con animali di terzi per minimo 4 settimane)
- Oppure sistemarli nelle stalle su lettiera con rinnovo completo dello strame



## Attenzione

- Pulizia dei mezzi di trasporto e della rampa di carico/scarico
- Dopo il bagno podale: evitare sentieri paludosi percorsi in precedenza o le medesime aree adibite all'uscita

© Copyright: La riproduzione o la pubblicazione dell'opuscolo e delle immagini o parti di esse sono consentite unicamente con citazione della fonte previa autorizzazione scritta della Sede amministrativa.