



Malattia della lingua blu: Raccomandazioni per la vaccinazione dal SSPR 2026

Il SSPR raccomanda la vaccinazione per tutte le specie sensibili: pecore, capre, piccoli camelidi del nuovo mondo e bovini.

- **Novità nel 2026: Una vaccinazione contro il BTV-3 e un vaccino combinato contro i BTV-4 / BTV-8 è raccomandata.** I due vaccini possono essere somministrati contemporaneamente, ma in punti diversi dell'animale
- Per **tutte** le specie sensibili, che non sono mai state vaccinate: **una vaccinazione di base con due iniezioni a 3–4 settimane di intervallo, tra gennaio e marzo 2026** è raccomandata
- **Una vaccinazione di richiamo annuale** è raccomandata, una volta tra **gennaio e marzo 2026**
- **Capre e piccoli camelidi: due vaccinazioni con la dose ovina.**

BTV: Domande frequenti (FAQ)

Gli animali gravidi possono essere vaccinati?

Sì, secondo le istruzioni del produttore, il vaccino può essere utilizzato durante la gestazione.

Quando possiamo aspettarci una solida protezione vaccinale?

Circa 3 settimane dopo la fine della vaccinazione di base. La vaccinazione non può prevenire completamente l'infezione, ma protegge dalle forme gravi della malattia.

Devo vaccinare i miei animali sia contro il BTV-3 che sia contro i BTV-8 / BTV-4?

Sì. Deve essere effettuata una vaccinazione di base per ogni sierotipo. Il vaccino Bultavo 3 è autorizzato in Svizzera per la vaccinazione contro il sierotipo 3, mentre BTVPUR (vaccino combinato) è autorizzato per i sierotipi BTV-8 e BTV-4.

Mostre, mercati, concorsi zootecnici: posso ancora parteciparvi?

Gli uffici veterinari cantonali sono responsabili della regolamentazione del traffico di animali. Il servizio veterinario svizzero ha deciso le seguenti misure a partire dal 2025: il BTV-3 e il BTV-8 sono ampiamente diffusi in Svizzera, motivo per cui non vi sono più misure di divieto nei confronti delle aziende colpite dalla malattia. Tuttavia, gli animali clinicamente malati non possono essere spostati. In caso di sospetto, non è autorizzato alcun trasporto di animali da o verso l'azienda fino alla comunicazione dei risultati delle analisi. Sì, raccomanda di attendere tre settimane dalla fine della vaccinazione di base prima di permettere agli animali di partecipare a concorsi, mercati e mostre.

Le aziende agricole che sono state infettate dal BTV devono ancora vaccinare i loro animali?

Sì, la percentuale di animali naturalmente infetti in un allevamento è spesso relativamente bassa.

Esiste un'indennità o un aiuto finanziario per la vaccinazione?

Gli allevatori dovevano registrare gli animali vaccinati nella BDTA entro il 31 agosto 2025. Il pagamento dell'indennità avverrà nel 2026 tramite il conteggio BDTA. Non si sa ancora se gli animali vaccinati dopo il 31 agosto 2025 daranno diritto a un'indennità.

BTV: Informazioni generali

Durante l'epidemia attuale della malattia della lingua blu (febbre catarrale) di sierotipo 3 (BTV-3), dal settembre 2023, si sono verificate infezioni nei Paesi Bassi, nel Nord della Germania ed in Inghilterra.



In Svizzera, il virus è stato rilevato per la prima volta il 29 agosto 2024 nei cantoni del Giura e Soletta. Da allora ha continuato a diffondersi.

Nel 2024, le infezioni dal virus della lingua blu del sierotipo 8 (BTV-8) si sono verificate principalmente nella parte ovest e sud della Svizzera, ma successivamente animali infetti dal BTV-8 sono stati rilevati in tutti i cantoni. Il numero di casi è nettamente più alto per le infezioni dal BTV-3 rispetto a quelle dal BTV-8. Si prevede che anche infezioni dal BTV-4 compariranno prossimamente in Svizzera.

Tutti i ruminanti possono essere infettati. In caso di infezione da BTV-3, i sintomi clinici gravi si manifestano negli ovini, ma sempre più spesso anche nei bovini. Le capre e i piccoli camelidi sono meno colpiti dalla malattia.

La malattia è trasmessa da **insetti pungitori (ceratopogonidi)**, che sono attivi da giugno a fine novembre. Volano soprattutto al crepuscolo e di notte.

Sintomi

- Febbre alta
- Salivazione schiumosa
- Gonfiore delle labbra
- Gonfiore della lingua e colorazione blu (= febbre catarrale)
- Lesioni e ulcerazioni in bocca e sulla lingua
- Gonfiore della testa e delle gambe
- Secrezioni nasali e sintomi di una malattia respiratoria
- Zoppia
- Possibilità di aborto
- Morti

È anche possibile che compaiano solo alcuni sintomi.

Gli animali sospetti devono essere segnalati immediatamente al veterinario dell'azienda.



Foto di pecore infette (fonte foto 1 e 2: R. van den Brom; fonte foto 3: SSPR)



La vaccinazione offre la migliore protezione contro le malattie gravi.

Il rischio di infezione può essere ridotto con altre misure di protezione, come la **stabulazione degli animali a partire dalle prime ore della sera** e il **trattamento con repellenti**, che però non garantiscono una protezione totale.

Maggiori informazioni su :

- USAV:
<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bt.html>
- Servizi veterinari cantonali:
<https://www.kantonstieraerzte.ch/fr/uber-uns>

Aggiornato: 18.11.2025